

LÁHEVNÍK OSTNITÝ

Annona muricata

Anona mäkkoostnitá

Další názvy:

Anona ostnitá, graviola



ÚČINNÉ LÁTKY

Acetogeniny, cyklické hexapeptidy



ÚČINKY

Cytotoxický účinek na leishmaniózu, antivirový účinek na herpes simplex virus 1, protinádorový, hojivý účinek na rány, antibakteriální.



POUŽITÍ

Bakteriální infekce, leishmanióza, herpetické infekce, rakovina.



BEZPEČNOST

V těhotenství a kojení se nedoporučuje pro nedostatek údajů. Při extrémně vysokých dávkách vyvolával Parkinsonský syndrom.



ZPŮSOB POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Obsahové látky jsou obsaženy v kořenech, semenech i listech, obvykle se užívá extrakt z listů, nejčastěji v literatuře v dávce 300 mg extraktu z listů denně po dobu 8 týdnů, poté obvykle měsíc pauza, nicméně klinických studií mnoho k dispozici nemáme.

Zdroje:

Rajeswari et al., PHYTOCHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL PROPERTIES OF ANNONA MURICATA: A REVIEW, *Int J Pharm Pharm Sci*, Vol 4, Issue 2, 3-6

Wai-Jo Jocelin Chan, Andrew J McLachlan, Jane R Hanrahan, Joanna E Harnett, The safety and tolerability of *Annona muricata* leaf extract: a systematic review, *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, Volume 72, Issue 1, January 2020, Pages 1–16

Tento materiál je určen výhradně pro členy kurzu Akademie léčivých rostlin. Nedovolené šíření či kopírování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno.

© Karolína Romášková www.kpramenizdravi.cz